



# VACINAÇÃO

- Idealmente a mulher deveria completar o calendário vacinal durante o período preconcepcional.
- São contraindicadas as vacinas de vírus vivo atenuado: triplice viral, varicela, HPV, febre amarela (esta última pode ser considerada de acordo com o risco, entretanto contraindicada na lactante).
- As vacinas inativas podem ser usadas durante a gestação, evitando-se o primeiro trimestre.

| Vacinas do Calendário da Mulher                                             | Esquema completo                                                                                                   | Situação antes de engravidar                                        | Conduta na gravidez                                                    | Conduta após a gravidez                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| HPV <sup>(1)</sup>                                                          | Três                                                                                                               | Não vacinada                                                        | Não vacinar                                                            | Iniciar esquema de doses                          |
|                                                                             |                                                                                                                    | Vacinada                                                            | Interromper                                                            | Continuar sem recomençar esquema de doses         |
| Triplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)                                 | Duas                                                                                                               | Nenhuma dose anterior                                               | Não vacinar                                                            | Iniciar esquema de doses                          |
|                                                                             |                                                                                                                    | Uma dose anterior                                                   | Não vacinar                                                            | Aplicar a segunda dose                            |
| Varicela                                                                    | Duas                                                                                                               | Nenhuma dose anterior                                               | Não vacinar                                                            | Iniciar esquema de doses                          |
|                                                                             |                                                                                                                    | Uma dose anterior                                                   | Não vacinar                                                            | Aplicar a segunda dose                            |
| Hepatite B                                                                  | Três                                                                                                               | Nenhuma dose anterior                                               | Iniciar esquema de doses                                               | Dar continuidade                                  |
|                                                                             |                                                                                                                    | Uma dose anterior                                                   | Continuar esquema de doses                                             | Dar continuidade                                  |
|                                                                             |                                                                                                                    | Duas doses anteriores                                               | Aplicar a terceira dose                                                | -                                                 |
|                                                                             |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                        |                                                   |
| Hepatite A <sup>(2)</sup>                                                   | Duas                                                                                                               | Nenhuma dose anterior                                               | Iniciar esquema de doses                                               | Dar continuidade                                  |
|                                                                             |                                                                                                                    | Uma dose anterior                                                   | Continuar esquema de doses                                             | -                                                 |
| Hepatite A e B combinadas                                                   | Três                                                                                                               | Nenhuma dose anterior                                               | Iniciar esquema de doses                                               | Dar continuidade                                  |
|                                                                             |                                                                                                                    | Uma dose anterior                                                   | Continuar esquema de doses                                             | Dar continuidade                                  |
|                                                                             |                                                                                                                    | Duas doses anteriores                                               | Aplicar a terceira dose                                                | -                                                 |
| Meningite C conjugada <sup>(3)</sup>                                        | Única                                                                                                              | Nenhuma dose anterior                                               | Avaliar risco                                                          | -                                                 |
| Triplice bacteriana acelular (difteria, tétano e coqueluche) <sup>(4)</sup> | Três (sendo 2 doses de dT e 1 dose de dTpa, com esta última, a partir da 20ª semana, o mais precocemente possível) | Nenhuma dose anterior ou desconhecido                               | Iniciar esquema completo                                               | Dar continuidade                                  |
|                                                                             |                                                                                                                    | Vacinação dT ou dTpa incompleta com última dose há menos de 10 anos | Completar esquema de 3 doses, sendo uma delas, necessariamente, a dTpa | Dar continuidade                                  |
|                                                                             |                                                                                                                    | Vacinação dT ou dTpa completa há mais de 10 anos                    | Aplicar dTpa (a partir da 20ª semana, o mais precocemente possível)    | -                                                 |
| Influenza (gripe)                                                           | Uma dose anual                                                                                                     | Ainda não vacinada na sazonalidade                                  | Vacinar                                                                | -                                                 |
| Febre amarela                                                               | Uma dose a cada dez anos                                                                                           | Não vacinada                                                        | Em princípio, não vacinar, mas avaliar risco                           | Se lactante, vacinar após o sexto mês do lactente |

Quadro 1 – Roteiro para vacinação da gestante – Consenso SBIM & FEBRASGO 2017-2018.

#### LEMBRETES

- A vacina contra hepatite A é inativada, portanto, sem evidências de riscos teóricos para a gestante e feto. Em situações de risco de exposição ao vírus, não está contraindicada em gestantes.
- A vacina meningocócica conjugada quadrivalente (tipos A, C, W135 e Y) deve ser considerada opção para imunização das adolescentes e mulheres adultas.
- A vacina dTpa (tríplice bacteriana acelular do tipo adulto) é inativada, portanto, sem evidências de riscos teóricos para gestante e o feto. Na gravidez, a aplicação de esquema dT/dTpa é recomendada após a 20ª semana, com intervalo de 30 a 60 dias entre as doses, devendo ser completado até 20 dias da data prevista para o parto. Deve ser feita a cada gestação.
- Para a vacina de febre amarela não há consenso sobre a duração da proteção conferida pela vacina. De acordo com o risco epidemiológico, uma segunda dose pode ser considerada pela possibilidade de falha vacinal.
- A vacina contra a dengue é contraindicada na gravidez e durante a amamentação.

#### LEITURA SUGERIDA

1. Brasil. Ministério da Saúde. Programa Nacional de Imunizações. Brasília (dF): Ministério da Saúde; s.d. Disponível em: < <http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/vacinacao/calendario-vacinacao#gestante>
2. Programa Vacinal para mulheres 2017. São Paulo: FEBRASGO; 2017. Disponível: em [https://www.febRASGO.org.br/media/k2/attachments/13-PROGRAMA\\_VACINAL\\_PARA\\_MULHERES.pdf](https://www.febRASGO.org.br/media/k2/attachments/13-PROGRAMA_VACINAL_PARA_MULHERES.pdf)
3. Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIM). Calendário de Vacinação SBIm da Gestante. Recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) – 2018/2019 [Internet]. São Paulo: SBIM; 2019. Disponível em: <<https://sbim.org.br/images/calendarios/calend-sbim-gestante.pdf>
4. AMERICAN COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNECOLOGISTS. ACOG Committee Opinion n.741. Maternal Immunization. **Obstet Gynecol.**, v.131, n.6, p.215-217, 2018.